



# 聖慈保育所



## 保育事業の目的

心身ともに健やかに育成されるよう乳幼児期の保育・教育を行うほか、保育所保育指針に掲げる目標が達成されるよう教育を行うことを目的とします。

## 保育方針

- 多様なニーズに応え、安心安全に預けられる保育。
- 子どもたち一人ひとりの個性を尊重し長所を伸ばす保育。
- 豊かな感性を持ち、主体的・意欲的に生活し、自分を表現できる子どもに育てる
- 仲間や周りの人々の存在を大切に思い、協力し助け合い喜びにできる子に育てる。

## 保育目標

- 個々の生命の維持と情緒の安定を図る。
- 基本的な生活習慣を身につけられるようにする。
- 生活や遊びの中で物事をよく見つめ考え探求する心を育む。
- 心身ともに健康で思いやりのある子を育てる。

## 保育時間

月曜～土曜 7時30分 ～ 18時30分

□保育標準時間認定者 7時30分 ～ 18時30分（11時間）

□保育短時間認定者 8時30分 ～ 16時30分（8時間）

## 開所日

月曜～土曜

ただし、日曜、祝日、12月29日～1月3日は除く。

## 登降園について

- 登降園の送迎は保護者の責任において行ってください。
- 交通事故防止のため交通ルールを知らせましょう。
- 欠席、早退等の場合は連絡してください。

### お昼寝について

- 午睡は子どもの健康管理のために大切な保育内容のひとつです。
- 年齢により4月（未満児）、6月頃（年長）から始めます。

### 給食・おやつについて

- 主食・副食を提供します。
- 3歳未満児は完全給食（主食・副食）ですが、3歳以上児は、主食代（米代）を実費負担していただきます。
- おやつは手作りのものや、牛乳・果物・菓子等です。
- 3歳未満児は10時と15時、3歳以上児は15時です。
- 土曜は牛乳とパンを提供します。
- 土曜日午後保育を利用される方は、おかず入りお弁当を持参してください。
- 行事（遠足等）によっては、おかず入りお弁当を持参していただく日もあります。

### 服装について

- 夏季（6月～9月）は指定の服はありません。
- 夏季以外（4、5月、10月～3月）園児服を着用。
- 活動しやすく着脱の楽なものにしてください。
- 着替え等は保育所に備えています。
- すべての衣服等に名前を記入してください。

### 保育所からの連絡

- 園だより、献立だより、その他必要に応じて連絡文書を発行します。
- 連絡ノートは保育所、家庭間でのお子さんの様子を連絡し合うためのものです。  
ご家庭での様子や保育所への諸連絡等、自由にお書きください。

### 生活習慣・衛生面・健康状態や病気について

- 洗顔・歯磨きを習慣づけましょう。保育園でも食後は歯磨きをします。
- 朝の食事をして登園しましょう。
- 手足の爪は、適時短く切りましょう。
- 園で着替えた場合は、園で洗濯をします。
- 園で使用した紙おむつは園で処分します。

○お子様の健康状態で気になる事がありましたら、送迎時や電話・連絡ノート等でお知らせください。

○ハンカチ・チリ紙は毎日持たせてください。

○歯ブラシは使えなくなったら、園で取り替えます。

○病気の兆しを感じられたら、早めに医師の検診を受けてください。

○薬を持たせる場合は1回分を1つの袋に入れ、名前を書いてください。

○病気の場合は医師の指示で出欠を決めてください。

○嘱託医及び嘱託歯科医による健診及び検尿を年2回実施します。

《子どものかかりやすい主な感染症》

病名	原因	症状	登園に関して
はしか (麻疹)	◆麻疹ウイルス 潜伏期間 10~12日 ・飛沫感染、空気感染、接触感染	発熱、くしゃみ、鼻水等 風邪に似た症状から始まり、40℃近くの高熱が2~3日続く。頬の内側に白い斑点が出た後、顔、胸、手、足に赤い発疹が広がる。	解熱後3日経過するまで登園停止。
風しん	◆風しんウイルス 潜伏期間 2~3週間 ・飛沫感染	38℃前後の熱と同時にピンク色の細かい発疹が顔や首、全身に広がる。リンパ腺の腫れを伴う。	発疹が消えるまで登園停止。
水ぼうそう (水痘)	◆水とう帯状ほうしんウイルス 潜伏期間 2~3週間 ・飛沫感染、接触感染	37~38℃の微熱と同時に頭部から首にかけて赤くかゆみの強い発疹が出る。その後、顔、口の中、胸、背中、手足、頭皮に赤い発疹が広がる。	発疹がすべてかさぶたになるまで登園停止。
おたふくかぜ (流行性耳下腺炎)	◆ムンプスウイルス 潜伏期間 2~3週間 ・飛沫感染、接触感染	耳の下の耳下腺で炎症が起こり、耳の下からあごにかけて、はれと痛みが出る。38℃前後の熱が出る場合が多い。	耳の下のはれが発現した後5日経過し、かつ、全身状態がよくなるまで登園停止。

インフルエンザ	◆インフルエンザウイルス 潜伏期間 1～3 日 ・飛沫感染、接触感染	悪寒やのどの痛み、咳、鼻水等の風邪の症状から始まり、40℃前後の高熱が出る。	発症した後5日経過し、かつ、解熱後 3 日経過するまで登園停止。
咽頭結膜炎 (プール熱)	◆アデノウイルス 潜伏期間 5～7 日 ・飛沫感染、接触感染	突然 38～40℃の高熱が出て、のどの腫れや痛みと同時に結膜炎が起こる。	症状が消えてから 2 日経過するまで登園停止。
流行性結膜炎 (はやり目)	◆アデノウイルス 潜伏期間 1～2 週間 ・接触感染	充血と目やに、まぶたの腫れや異物感、痛みなどが起こる。	目の症状が治まり、医師が伝染のおそれなしと認めるまで登園停止。
溶連菌感染症	◆A 群 β 溶血性連鎖球菌 潜伏期間 2～5 日 ・飛沫感染、経口感染	突然の高熱があり、のどが炎症を起こし、真っ赤に腫れる。その後、手足の指先や、全身に赤い粟粒大の発疹が出たり、舌に赤いぶつぶつが出る。	抗生物質の服用を始めてから 24～48 時間経過すれば、登園可能。
手足口病	◆コクサッキーウイルス 潜伏期間 2～5 日 ・飛沫感染、接触感染	手のひら、足の裏、口の中等に赤い発疹ができる。	熱が下がり、1 日以上経過して、食事を普通にとれるようになれば登園可能。
ヘルパンギーナ	◆コクサッキー・エコーウイルス 潜伏期間 2～4 日 ・飛沫感染、接触感染	突然 40℃近い高熱が出て、口蓋垂の周囲に白い水ぼうがができる。	熱が下がり、喉の痛みがとれて、食欲が戻れば登園可能。
RS ウイルス	◆RS ウイルス 潜伏期間 4～6 日 ・飛沫感染	鼻水、咳等の風邪に似た症状。	全身状態がよくなれば登園可能。
とびひ	◆黄色ブドウ球菌、溶連菌 潜伏期間 2～10 日 ・接触感染	皮膚に強いかゆみのある水ぼうがができる。破れた水ぼうは、ただれた赤くむけた状態になる。	患部が乾燥するか、じくじくしている部分をガーゼ等で覆うことができれば登園可能。

## 主な行事予定

実施月	行 事 名
4月	★入園式・進級式、お花見会、花まつり
5月	★子どもの日の集い、★親子遠足
6月	創立記念日、虫歯予防デーの集い、かしわ餅作り、★プール設営 ★プール開き
7月	七夕まつり会、★プール参観、夕涼み会
8月	★盆踊り会、★プールさよなら会
9月	お月見会、★運動会
10月	秋の遠足、写生会
11月	防火パレード、お相撲大会
12月	★餅つき会、お店屋さんごっこ、クリスマス会、除夜の鐘撞体験
1月	春の七草会、書初め
2月	節分会、★発表会
3月	ひな祭り会、お別れ遠足、お別れ会、★卒園式
毎月	誕生会、お茶教室
随時	備北丘陵公園体験プログラム 福祉施設への慰問及び町内外のイベントステージ出演等

★印は保護者又は家族参加の行事です。